

Link do produktu: <https://www.flopsy.pl/dronspot-1-pipeta-leczenie-mieszanych-inwazji-pasozytnicznych-u-kotow-3-warianty-p-290.html>



DRONSPOT 1 pipeta. Leczenie mieszanych inwazji pasożytniczych u kotów. 3 warianty

Cena	35,00 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	S

Opis produktu



Zastosowanie: Leczenie mieszanych inwazji pasożytniczych u kotów .

Działanie:

Dronspot roztwór do nakrapiania dla kotów. Każda pipetka zawiera: Substancje czynne: Prazikwantel i Emodepsyd
Inwazje spowodowane przez następujące gatunki robaków obłych i robaków płaskich:

Robaki obłe (nicienie) *Toxocara cati* (postaci dojrzałe, niedojrzałe, stadia larwalne L4 i L3) *Toxocara cati* (stadia larwalne L3) – leczenie kotek w okresie późnej ciąży w celu zapobiegania przeniesieniu drogą laktogenną na potomstwo *Toxascaris leonina* (postaci dojrzałe, niedojrzałe i stadia larwalne L4) *Ancylostoma tubaeforme* (postaci dojrzałe, niedojrzałe i stadia larwalne L4)
Robaki płaskie (tasiemce) *Dipylidium caninum* (postaci dojrzałe i niedojrzałe) *Taenia taeniaeformis* (postaci dojrzałe)
Echinococcus multilocularis (postaci dojrzałe)

Przeciwwskazania:

Nie stosować u kociąt poniżej 8 tygodnia życia lub ważących poniżej 0,5 kg. Nie stosować w przypadkach znanej nadwrażliwości na substancje czynne lub na dowolną substancję pomocniczą

Dawkowanie:

Zalecana minimalna dawka to 3 mg emodepsydu/kg masy ciała oraz 12 mg prazykwantelu/kg masy ciała, co odpowiada 0,14 ml produktu Dronspot na/kg masy ciała.

Dla kota o wadze >0,5 do 2,5 kg 1 pipetka 0,35 ml

Dla kota o wadze >2,5 do 5 kg - 1 pipetka 0,7 ml

Dla kota o wadze >5 - 8 kg 1 pipetka 1,12 ml

W zwalczaniu robaków obłych i robaków płaskich jako cała kuracja skuteczne jest jednokrotne podanie. U kotek ciężarnych, w celu zapobiegania przeniesieniu *Toxocara cati* (stadia larwalne L3) wraz z mlekiem na potomstwo, skuteczne jest jednorazowe podanie na około siedem dni przed spodziewanym porodem.

Sposób podawania:

Podanie zewnętrzne przez nakrapianie na skórę. Przed zastosowaniem produktu należy dokładnie zważyć kota, aby dobrać dla niego właściwą wielkość pipety. Oddziel jedną pipetkę od opakowania. Trzymając pipetkę w pozycji pionowej, końcówką do góry, przekręć i zdejmij końcówkę, po czym użyj drugiej strony końcówki aby zerwać zamknięcie. Rozsuń kotu sierść na szyi, u podstawy czaszki tak, aby widoczna była odsłonięta skóra. Przytknij koniec pipetki do skóry i mocno ściśnij kilkakrotnie pipetkę w celu wyciśnięcia jej zawartości bezpośrednio na skórę. Naniesienie produktu u podstawy czaszki ograniczy do minimum możliwość zlizania go przez kota.

Substancje czynne: EMODEPSYD;PRAZIKWANTEL;

UWAGA!!!

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, produkt jest dostępny do sprzedaży tylko w przypadku odbioru osobistego lub zlecenia odbioru w wybranej firmie kurierskiej. Nie wystawiamy faktury VAT!

Produkty lecznicze nie podlegają zwrotowi; zwrot tego rodzaju produktów możliwy jest wyłącznie w przypadku wady jakościowej produktu lub jego niewłaściwego wydania. Podlega to regulacji art. 96 ustawy z dnia 6 września 2001r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008r., nr 45, poz. 271)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wariant: DRONSPOT 0,35 ML MAŁY KOT , DRONSPOT 0,7 ML ŚREDNI KOT , DRONSPOT 1,12 ML DUŻY KOT