FloPsy,
ul. Lipowa 1, 95-083 Florentynów
NIP: 7261670080
ERSTE: 48 1090 1304 0000 0001 6588 7270
E-mail: flopsy@flopsy.pl
Telefon: +48 785 512 000

Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 19:16

Link do produktu: https://www.flopsy.pl/ecocid-s-50-g-1-szaszetka-proszek-rozpuszczalny-w-wodzie-przeznaczony-do-dezynfekcji-p-137.html



ECOCID S 50 G (1 szaszetka) - Proszek rozpuszczalny w wodzie przeznaczony do dezynfekcji.

Cena	**15,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Kod EAN	**3838989533380**

Opis produktu

Zastosowanie: Proszek rozpuszczalny w wodzie przeznaczony do dezynfekcji.

Działanie: Ecocid® S jest preparatem dezynfekcyjnym wykazującym aktywność przeciwko wirusom. Posiada również właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze w stosunku do Candida albicans. • Preparat biobójczy do stosowania w medycynie weterynaryjnej • Preparat do dezynfekcji systemów wody pitnej przeznaczonych dla zwierząt • Preparat dezynfekcyjny do stosowania w przemyśle spożywczym i paszowym Dzięki szerokiemu spektrum działania biobójczego preparat może być używany w: medycynie weterynaryjnej: (gabinety, kliniki, laboratoria weterynaryjne) do dezynfekcji powierzchni, wyposażenia, pojemników, naczyń szklanych, instrumentów itp., hodowli zwierząt: do dezynfekcji wszelkich powierzchni i wyposażenia używanego do przygotowywania karmy, jak również w stajniach, oborach, schroniskach dla psów, wszelkich klatkach dla zwierząt, ulach, lub w innych pomieszczeniach gdzie trzymane są zwierzęta, inne miejsca zastosowania: do dezynfekcji środków transportu dla zwierząt, powierzchni i sprzętu na targach zwierząt, rzeźni, miejsc obróbki i przechowywania żywności oraz do dezynfekcji sprzętu i powierzchni w gospodarstwie domowym.

Dawkowanie: Ecocid® S jako roztwór aktywny jest stosowany w postaci aerozolu, rozpylania, zamgławiania lub kąpieli np. kopyt, a także do stosowania na wszelkich barierach dezynfekcyjnych – np. maty. Do ogólnej dezynfekcji uprzednio oczyszczonej powierzchni i wyposażenia należy przygotować 1 % roztwór Ecocid® S. W tym celu należy rozpuścić zawartość 50 g opakowania w 5 litrach wody. Polecane jest użycie letniej wody w celu szybszego rozmieszania preparatu.