FloPsy,
ul. Lipowa 1, 95-083 Florentynów
NIP: 7261670080
ERSTE: 48 1090 1304 0000 0001 6588 7270
E-mail: flopsy@flopsy.pl
Telefon: +48 785 512 000

Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 19:58

Link do produktu: https://www.flopsy.pl/polisept-vet-wound-gel-silver-pro-30ml-p-347.html



POLISEPT VET WOUND GEL SILVER PRO 30ml

Cena	**79,90 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Kod EAN	**5902596718480**

Opis produktu

POLISEPT VET Wound Gel Silver PRO jest nowoczesnym preparatem stosowanym w pielęgnacji i wspomaganiu leczenia ran u zwierząt. Aktywny opatrunek w formie żelu hydro-koloidowego do stosowania na wszelkiego rodzaju rany z dodatkiem nano-srebra, o właściwościach przeciwbakteryjnych.

Właściwości:

Przyśpiesza i usprawnia proces gojenia się rany. Zapewnia optymalny bilans wodny w obrębie rany.

Oczyszcza rany z zanieczyszczeń biologicznych powstających w trakcie gojenia się rany (produkty przemiany materii, toksyny itp.).

Zabezpiecza rany przed zakażeniem z zewnątrz, zapewniając jednocześnie optymalną wymianę gazową.

Zapobiega tworzeniu się biofilmu bakteryjnego. Przyśpiesza proces angiogenezy w obrębie rany.

Doskonale wpisuje się w schemat „T I M E" postępowania z ranami.
Preparat ma bardzo gorzki smak, co zapobiega wylizywaniu żelu przez zwierzę.

WSKAZANIA I SPOSÓB STOSOWANIA

POLISEPT VET Wound Gel Silver PRO stosuje się wspomagająco w leczeniu:

- Ran chirurgicznych.
- Ran ostrych zakażonych i jałowych.
- Ran przewlekłych (odleżyny, owrzodzenia różnego pochodzenia).
- Ran z martwicą suchą lub rozpływną.
- Ran powierzchownych i głębokich (szarpanych, gryzionych z zachyłkami i kieszonkami).
- Oparzeń I-go i II-go stopnia.

Dawkowanie:
1. Ranę przemyć płynem Polisept Vet Wound Irrigation Silver Pro, jeśli zachodzi taka konieczność.

2. Wyciskając z tuby nanieść cienką warstwę żelu (3-5mm) bezpośrednio na ranę (żel można nanieść za pomocą jałowej szpatułki.
3. W przypadku ran głębokich wypełnić ranę żelem do jej 2/3 głębokości, tak, aby żel nie wystawał ponad powierzchnię skóry.
4. Ranę przykryć wtórnym opatrunkiem (w przypadku codziennej wymiany żelu w ranie, można nie używać opatrunków wtórnych) - żel może być zmieniany codziennie lub pozostać w ranie do 3 dni.

Skuteczność POLISEPT® VET Wound Gel Silver PRO:

- Efektywnie nawilża ranę i reguluje wymianę wodną i gazową w ranie
- Adsorbuje wysięk z rany
- Skutecznie usuwa nieorganiczne zanieczyszczenia mechaniczne, oraz zanieczyszczenia organiczne, tkankę nekrotyczna, włókna fibrynowe, skrzepy krwi

Unikalne właściwości **POLISEPT VET Wound Gel Silver PRO** wynikają z synergicznego działania głównych substancji czynnych, czynnika przeciwbakteryjnego i tenzydu zawartych w żelu hydro-koloidowym, wzbogaconym w nano-srebro.

Substancje czynne:

POLISEPT® VET Wound Gel Silver PRO zawiera dwie synergicznie działające substancje czynne (wzbogacone o nano-srebo):

Poliheksanidyna (PHMB):

biguanidowy środek o szerokim spektrum działania przeciw drobnoustrojom patogennym m. in. *Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Streptococcus faecalis, Escherichia coli, Pseudomonas putida, Klebsiella aerogenes* w tym wysoka skuteczność w stosunku do MRSA (szczepy *Staphylococcus aureus* oporne na metycylinę), aktywność przeciwgrzybicza: min. *Aspergillus Niger, Trichophyton mentagrophytes,* brak rozwoju oporności drobnoustrojów, właściwości przeciwzapalne, Indeks Biozgodności BI>1 (wysoka aktywność przeciwdrobnoustrojowa i niewielka cytotoksyczność), brak działania alergizującego (indeks 1:10 000).

Poliheksanidyna wykazuje powinowactwo do błon komórkowych drobnoustrojów. Wchodząc w reakcje z białkami błon komórkowych neutralizuje ich system odporności i wnika do wnętrza komórki bakteryjnej. Następnie łączy się z białkami błon cytoplazmatycznych doprowadzając do utraty jonów Mg i Ca, czego konsekwencją jest przerwanie ciągłości błon cytoplazmatycznych komórki bakteryjnej. Na tym etapie działania PHMB, proces jest nieodwracalny i doprowadza do śmierci komórki bakteryjnej na skutek utraty istotnych elementów morfotycznych. **Ze względu na swoje szerokie i specyficzne właściwości, PHMB rekomendowana jest jako środek z wyboru w postępowaniu z trudno gojącymi się ranami przewlekłymi.**

Betaina (tenzyd): łagodnie działająca substancja powierzchniowo czynna skutecznie usuwająca zanieczyszczenia mechaniczne i biologiczne w tym BIOFILM BAKTERYJNY. bardzo dobra tolerancja skórna, nie wykazuje działania wysuszającego na skórę i błony śluzowe.

Mechanizm działania Betainy:

Betaina jest łagodnie działającą substancją powierzchniowo czynną, niezwykle efektywną w irygacji ran. Mechanizm działania betainy polega na obniżeniu napięcia powierzchniowego fazy płynnej, co doprowadza do oddzielania się od podłoża substancji organicznych (drobnoustroje, tkanki nekrotyczne itp.), jak i nieorganicznych. Jednocześnie zapobiega ponownemu łączeniu się oderwanych elementów w agregaty lub ponownemu przyczepianiu się drobnoustrojów do podłoża rany, tym samym efektywnie wpływa na wypłukiwanie wszelkich „zanieczyszczeń" z rany. Szczególną właściwością betainy jest zdolność do niszczenia integralności BIOFILMU bakteryjnego w obrębie rany i tym samym eksponowanie drobnoustrojów na działanie min. antybiotyków. Biofilm bakteryjny stanowi istotną przeszkodę w leczeniu ran przewlekłych (stwierdzany jest w ponad 60% ran przewlekłych) oraz ran ostrych w pierwszych godzinach postępowania leczniczego.

Żel hydrokoloidowy:

Zapewnia odpowiednie warunki wilgotności rany – utrzymuje optymalna wilgotność w obrębie rany:

- nawilża zbyt suche rany,
- usuwa nadmiar wydzieliny w ranach zbyt wilgotnych,
- chroni ranę stwarzając barierę przeciwbakteryjną,
- jest bardzo dobrze tolerowany przez tkanki.

FloPsy,
ul. Lipowa 1, 95-083 Florentynów
NIP: 7261670080
ERSTE: 48 1090 1304 0000 0001 6588 7270
E-mail: flopsy@flopsy.pl
Telefon: +48 785 512 000

Nanosrebro:

Ta forma srebra hamuje wzrost drobnoustrojów i posiada właściwości przeciwzapalne. Bardzo małe cząsteczki potęgują skuteczność działania preparatu, a dzięki ich wysokiej i trwałej aktywności działanie nie słabnie z upływem czasu.