

Link do produktu: <https://www.flopsy.pl/vectra-3-d-dla-psow-10-25-kg-1-pipeta-pchly-kleszcze-p-10.html>

VECTRA 3 D DLA PSÓW >10 - 25 KG - 1 PIPETA - Pchły Kleszcze

Cena	50,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod EAN	3411112079926

Opis produktu

**Oferta dotyczy sprzedaży 1 pipety preparatu VECTRA 3D dla psów o wadze od 10 do 25 Kg****Zastosowanie:** Zwalczanie i odstraszanie : pcheł , kleszczy , moskitów , komarów i bolimuszek u psów 10-25 kg .

Działanie: Roztwór do nakrapiania . Każdy ml zawiera 54 mg dinotefuranu, 4,84 mg pyriproksyfenu i 397 mg permetryny.
Pchły: Lek weterynaryjny zabija pchły u zakażonych zwierząt oraz zapobiega ponownej infestacji przez jeden miesiąc. Wykazuje on skuteczność wobec następujących pcheł występujących u psów (*Ctenocephalides canis* i *Ctenocephalides felis*). Lek zapobiega także namnażaniu pcheł przez dwa miesiące po podaniu, hamując wylęganie jaj (działanie jajobójcze) oraz hamując przeobrażenie postaci niedojrzałych w dorosłe pchły. Lek weterynaryjny może być stosowany jako element strategii leczenia alergicznego pchlego zapalenia skóry (APZS) oraz stanu zapalnego skóry. **Kleszcze:** Lek weterynaryjny zabija i odstrasza kleszcze (wobec *Rhipicephalus sanguineus* i *Ixodes ricinus* działanie utrzymuje się przez jeden miesiąc; wobec *Dermacentor reticulatus* działanie utrzymuje się do trzech tygodni). W przypadku obecności kleszczy podczas podawania leku, nie wszystkie one mogą zostać zabite w ciągu pierwszych 48 godzin po podaniu, ale mogą one zostać zabite w ciągu tygodnia. Zaleca się użycie odpowiedniego urządzenia w celu usunięcia kleszczy. **Moskity, komary i bolimuszki:** Lek weterynaryjny odstrasza (zapobiega ukąszeniom) owady latające takie jak moskity (*Phlebotomus perniciosus*), komary (*Culex pipiens*, *Aedes aegypti*) oraz bolimuszki (*Stomoxys calcitrans*) przez jeden miesiąc po podaniu. Lek zabija także komary (*Aedes aegypti*) i bolimuszki (*Stomoxys calcitrans*) przez jeden miesiąc od podania.

Przeciwwskazania: Nie stosować u kotów (patrz „Specjalne ostrzeżenia”). Produktu leczniczego weterynaryjnego nie należy stosować u kotów ze względu na ich unikalną fizjologię i niezdolność metabolizowania permetryny (jedna z substancji czynnych w produkcie). W przypadku podania kotu lub połknięcia przez kota, aktywnie wylizującego niedawno leczonego psa, produkt leczniczy weterynaryjny może mieć poważne szkodliwe działanie. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancje czynne lub na dowolną substancję pomocniczą.

Dawkowanie: Minimalna zalecana dawka to 6,4 mg dinotefuranu/kg masy ciała, 0,6 mg pyriproksyfenu/kg masy ciała i 46,6 mg permetryny/kg masy ciała, co odpowiada 0,12 ml leku weterynaryjnego na kg masy ciała.

Substancje czynne: PYRIPROXYFEN;PERMETRYNA;DINOTEFURAN;